

PROTOCOL START SGLT2-REMMER

Cardiale indicaties:

1. *Behandeling van hartfalen ongeacht de LVEF*
2. *Cardiovasculaire risicoreductie bij DM2 patiënten met HVZ of een zeer hoog risico hierop.*

Contra-indicaties:

- eGFR <25 (bij dapagliflozine)
eGFR <20 (bij empagliflozine)
- type 1 DM
- Leeftijd <18 jaar
- zwangerschap of borstvoeding
- systolische RR <95 mmHg
- een actief voetulcus
- alcoholisme
- ondervoeding, intermitterend vasten of een sterk koolhydraat-beperkt dieet (<70 gram KH/dag)
- recidiverende genitale (mycotische) (UWI) infecties

Staken bij:

Gebruik *tijdelijk* staken en patiënt moet contact opnemen met huisarts bij:

- ontstaan van een voetulcus
- grote chirurgische ingreep
- koortsende ziekte, misselijkheid, braken, extreme dorst en elke andere situatie waarin de voedselinname fors verminderd is
- dreigende dehydratie (overweeg diureticadosering aan te passen ivm diuretisch effect SGLT2-remmer)
- ernstige acute ingreep

Gebruik staken en patiënt moet contact opnemen diabetesbehandelaar bij:

- gangreen van Fournier (een zeldzame infectie, gekenmerkt door pijn, roodheid of zwelling in het genitale of perianale gebied in combinatie met koorts)
- optreden hypoglykemie
- (verdenking) diabetische ketoacidose

Patiënt moet contact opnemen met diabetesbehandelaar bij:

- hypoglykemie-gevoelens patiënt
- alle infecties in anogenitale gebied

Voorwaarden:

Invullen artsverklaring noodzakelijk

<https://www.znformulieren.nl/337936417/Formulieren?folderid=338591792&title=Empagliflozine>

<https://www.znformulieren.nl/formulieren/documenten?folderid=338591791&title=Dapagliflozine>

Documenten/ links:

<https://www.farmacotherapeutischkompas.nl>